

| 化学療法レジメン名称 | 薬剤名称 | 投与量 | コース期間 (日ごと) | 投与日 |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|------|
| ドセタキセル(60)原法 | ドセタキセル注「コパ」(20mg/1mL) : タキテール | 60mg/m ² | 21 | day1 |
| アービタックス単剤(初回) | アービタックス注射液(100mg/20mL) | 400mg/m ² | 7 | day1 |
| アービタックス単剤(2回目以降) | アービタックス注射液(100mg/20mL) | 250mg/m ² | 7 | day1 |
| パクリタキセルWeekly(100) | パクリタキセル注(30mg/5mL) : タキソール | 100mg/m ² | 7 | day1 |
| アービタックス(初回)+wPTX | アービタックス注射液(100mg/20mL) | 400mg/m ² | 7 | day1 |
| | パクリタキセル注(30mg/5mL) : タキソール | 80mg/m ² | | day1 |
| アービタックス(2回目以降)+wPTX | アービタックス注射液(100mg/20mL) | 250mg/m ² | 7 | day1 |
| | パクリタキセル注(30mg/5mL) : タキソール | 80mg/m ² | | day1 |
| オブジーボ療法(240mg/Body) | オブジーボ点滴静注(20mg/2mL) | 240mg/Body | 14 | day1 |
| オブジーボ療法(480mg/Body) | オブジーボ点滴静注(20mg/2mL) | 480mg/Body | 28 | day1 |
| キイトルーダ療法(200mg/Body) | キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) | 200mg/Body | 21 | day1 |
| キイトルーダ療法(400mg/Body) | キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) | 400mg/Body | 42 | day1 |