

化学療法レジメン名称	薬剤名称	投与量	コース期間 (日ごと)	投与日
ペブレオ	ペブレオ注射用(5mg/V)	5mg/Body		day 1
ブレオ (局注)	ブレオ注射用(5mg/V)	5mg/Body		day 1
悪性黒色腫：オブジーボ療法 (240mg/Body)	オブジーボ点滴静注(20mg/2mL)	240mg/Body	14	day 1
悪性黒色腫：オブジーボ療法 (480mg/Body)	オブジーボ点滴静注(20mg/2mL)	480mg/Body	28	day 1
CPT-11療法	イリリテカン点滴静注液(40mg/2mL):ト ホ°テシ	100mg/m ²	7	day 1
DTIC単独療法	ダカルバジン注用(100mg/V)	1000mg/m ²	21	day 1
CBDCA+DXR療法	ドキシソルピシン注射用NK(10mg/V) : ア ドリアシ	30mg/m ²	28	day 1
	カルボプラチン注NK(150mg/15mL): パ°ラ°ラチ	5mgCalvert		day 1
ヤーボイ療法	ヤーボイ点滴静注液(50mg/10mL)	3mg/kg	21	day 1
悪性黒色腫:オ°ジ°ボ° + ヤ°ボ°イ	オブジーボ点滴静注(20mg/2mL)	80mg/Body	21	day 1
	ヤーボイ点滴静注液(50mg/10mL)	3mg/kg		day 1
血管肉腫：ドセタキセル(60)	ドセタキセル注「コ°」(20mg/1mL) : タ キセル	60mg/m ²	21	day 1
血管肉腫：weekly ト°セ°タ°セル(25)	ドセタキセル注「コ°」(20mg/1mL) : タ キセル	25mg/m ²	7	day 1
血管肉腫:weekly パ°クリ°タ°セル(80)	パクリタキセル注(30mg/5mL) : タ キセル	80mg/m ²	7	day 1
悪性黒色腫：キイトルーダ療法 (200mg/Body)	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	200mg/Body	21	day 1
悪性黒色腫：キイトルーダ療法 (400mg/Body)	キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)	400mg/Body	42	day 1
バベンチオ	バベンチオ点滴静注(200mg/10mL)	10mg/kg	14	day 1